

Después de las Vacunas...

El acetaminofén y el ibuprofeno son medicinas fuertes y SOLO se deben de utilizar cuando realmente se necesitan. Su hijo no necesita acetaminofén ni ibuprofeno si tiene enfermedad leve. Solo se debe dar acetaminofén o ibuprofeno si su hijo tiene fiebre (que usted ha medido con un termómetro) y no está comiendo, durmiendo ni jugando normal. Si le da acetaminofén o ibuprofeno a su hijo, lea las instrucciones en la etiqueta. Solo use la jeringa o tasita que viene con la medicina para medirla.

Si su hijo tiene fiebre (calentura):

- Dele muchos líquidos para tomar.
- Manténgalo fresco. No le ponga mucha ropa ni cobijas.
- Ponga su hijo en una bañera con un poquito de agua tibia.

Si su pierna o brazo está hinchado, caliente o rojo:

- Póngale una toallita mojada, limpia y fresca en la parte adolorida.
- Si no se mejora en 24 horas, llame al médico de su hijo.

¿Cuánta medicina puedo dar a mi hijo?

Acetaminofén (Tylenol® u otra marca) Se puede dar cada 4-6 horas como sea necesario. No se debe de dar más de cinco (5) veces en 24 horas (a menos que le diga el doctor). Lea y siga las instrucciones de la etiqueta. Solo use la jeringa o tasita que viene con la medicina para medirla. Vea al revés para información sobre el ibuprofeno.






Llame al médico de su hijo inmediatamente si su hijo:

- Tiene temperatura de 103° F (39.4°C) o más
- Está pálido o flojo (sin fuerza)
- Ha estado llorando por más de 3 horas
- Llora de forma chillido alto (fuera de lo normal)
- Está temblando, se tuerce sin control o tiene espasmos
- No está activo o no reacciona
- Si usted está preocupado por la manera que se ve o se siente el niño.

El teléfono del médico de su hijo es _____

6- 11 libras 0 – 3 meses	12- 17 libras 4 – 11 meses	18- 23 libras 12 - 23 meses	24- 35 libras 2- 3 años	36- 47 libras 4- 5 años	48 – 59 libras 6 – 8 años	60 – 71 libras 9 – 10 años	72 – 95 libras 11 años
1.25 mL Suspensión Oral 	2.5 mL Suspensión Oral 	3.75 mL Suspensión Oral 	5 mL Suspensión Oral 	1 ½ cucharaditas Jarabe para Niños 	2 cucharaditas Jarabe para Niños 	2 ½ cucharaditas Jarabe para Niños 	3 cucharaditas Jarabe para Niños 
ADVERTENCIA:			1 cucharadita Jarabe para Niños 	3 pastillas de 80 mg. para Niños 	4 pastillas de 80 mg. para Niños 	5 pastillas de 80 mg. para Niños 	6 pastillas de 80 mg. para Niños 
<ul style="list-style-type: none"> • Nunca debe dar aspirina a un niño (a menos que le diga el doctor). • Si usted le da a su hijo acetaminofén o ibuprofeno puro, NO le de también medicinas para catarrros, alergias o nariz tapada que contengan acetaminofén o ibuprofeno. Su hijo podría tomar demasiada medicina. • No le dé medicinas para adultos a los niños. • Mantenga las medicinas fuera del alcance de los niños. 			2 pastillas de 80 mg. para Niños 	2 pastillas de 160 mg. “Junior Strength” 	2 ½ pastillas de 160 mg. “Junior Strength” 	3 pastillas de 160 mg. “Junior Strength” 	

Ibuprofeno (Advil®, Motrin® u otra marca) Se puede dar cada 6-8 horas como sea necesario. No se debe de dar más de cuatro (4) veces en 24 horas (a menos que le diga el doctor). Lea y siga las instrucciones en la etiqueta. Solo use la jeringa o tasita que viene con la medicina para medirla. Vea al revés para información sobre el acetaminofén.

12 – 17 libras 6 – 11 meses	18 – 23 libras 12 – 23 meses	24 – 35 libras 2 – 3 años	36- 47 libras 4- 5 años	48- 59 libras 6- 8 años	60- 71 libras 9- 10 años	72- 95 libras 11 años
1.25 mL Gotas para Infantes 	1.875 mL Gotas para Infantes 	1 cucharadita Jarabe para Niños  ○	1 ½ cucharaditas Jarabe para Niños  ○	2 cucharaditas Jarabe para Niños  ○	2 ½ cucharaditas Jarabe para Niños  ○	3 cucharaditas Jarabe para Niños  ○
		2 pastillas de 50 mg. para Niños 	3 pastillas de 50 mg. para Niños 	4 pastillas de 50 mg. para Niños 	5 pastillas de 50 mg. para Niños 	6 pastillas de 50 mg. para Niños 
				○ 2 pastillas de 100 mg. “Junior Strength” 	○ 2 ½ pastillas de 100 mg. “Junior Strength” 	○ 3 pastillas de 100 mg. “Junior Strength” 

ADVERTENCIA:

- **Nunca dé aspirina a un niño (a menos que le diga el doctor).**
- **Si usted le da a su hijo acetaminofén o ibuprofeno puro, NO le de también medicinas para catarrros, alergias o nariz tapada que contengan acetaminofén o ibuprofeno. Su hijo podría tomar demasiada medicina.**
- **No dé medicinas para adultos a los niños.**
- **Mantenga las medicinas fuera del alcance de los niños.**

